

Obscurella martorelli martorelli

1



MZB 2009-0091, foto Gago & Cadevall, 2014.

HÀBITAT: Adherida a murs i roquerars, prop de fonts o rius. Fins a 1.600 metres.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Típica de la Muntanya de Montserrat.

FORMA CONQUILLA: piramidal / cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt 16mm i Ø 6,2mm.
8-9,5 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries
fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda

Pomatias elegans

2



MZB 2009-0138, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Boscos clars de poca altitud, roquerars i vegetació de matoll. Viu a sòls amb molt humus i sota pedres, tant a llocs humits com assolellats. Forma colònies abundants.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot Catalunya i Andorra.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt 18,5mm, Ø 13mm.
Voltes 4,5-5

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries
fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat / cobert

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda

Carychium minimum

3



ZB 2009-0582, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: llocs humits propers a l'aigua, viu sota pedres, troncs i fullaraca

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot Catalunya, també Andorra, Balears i altres llocs de la Península Ibèrica

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 2,5mm, $\varnothing$ 1 mm, voltes 4-5

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: Molt estret o tancat

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda

Rumina decollata



MZB 79-8417, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: de vida crepuscular, que viu enterrada, semi enterrada i sota pedres, formant grans colònies a ambients costaners, hortes, boscos, jardins, fonts i riberes. Li agraden els lloc antropitzats.

DISTRIBUCIÓ A CAT: molt comú a tota la Península Ibèrica, inclosa Catalunya i Andorra.

FORMA CONQUILLA: truncada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt 40-45mm (55mm en exemplars que no hagin perdut la punta), Ø 15-22mm. 8-10 voltes (adults 4-6)

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial

Cecilioides acicula



MZB 2009-1377, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: subterrani i calcícola. Viu enterrada fins i tot a profunditats de més de dos metres, sota pedres, a esquerdes profundes de roques, entre matèria orgànica, arrels de plantes i coves. Sol preferir llocs humits, formant colònies nombroses.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 6 mm, $\varnothing$ 1.7 mm, 5-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: piriforme

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial



MZB 2009-1394, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Sota pedres, entre fullaraca i troncs caiguts. No sol trobar-se per sobre dels 1.000m i sol agrupar-se en colònies.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt. 10,4 mm, Ø 4,0 mm, 5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: Sense umbilic

FORMA OBERTURA: piriforme

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial

Discus rotundatus



MZB 2009-1429, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Bosc humits i ombrívols caducifolis, ribes dels rius, jardins i hortes. Viu entre la fullaraca, sota pedres, troncs i fustes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 3 mm, Ø 7,5 mm, 5-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa / aquillada

SUTURA: profunda

Oxyloma elegans elegans



MZB 2009-0601, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie amfíbia, molt higròfila, que viu als cursos fluvials, fonts, llacunes i canals, sobre la vegetació, pedres i objectes de la superfície de l'aigua.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt 16mm, Ø 8mm. 3-3,5 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: piriforme

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB-2009-0620, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Llocs humits o ombrívols de boscos, riberes, cultius, prats de vall. Viu sota pedres i entre la fullaraca. També es troba prop de fonts i rierols. Tolerà substrats no calcaris.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt. 7,5mm i Ø 3,5 mm. 5-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils


GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: piriforme

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial



<https://www.nature-of-oz.com/valloniidae.htm>

HÀBITAT: Espècie higròfila, habitual a praderies humides i proximitats de rierols, tot i que també viu a biòtops secs calcaris. Viu entre la fullaraca i les herbes, sota pedres i troncs a llocs ombrívols i rics en matèria orgànica. Comú entre fulles mortes de pollancre.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 1,5mm i $\varnothing$ 2,9mm. 3-4 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda

Vallonia pulchella



MZB 2009-0683, foto Gago & T Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila, habitual a praderies humides i proximitats de rierols, i també zones seques. Viu entre les herbes i sota pedres i fullaraca.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 1,7mm i $\varnothing$ 2,9mm. 3-4 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



MZB 2009-0722, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Higròfila i calcícola, llocs de ribera i prats propers a déus o rierols, tot i que pot suportar ambients poc humits i exposats a zones rocoses i sorrenques. Viu entre la molsa, la fullaraca i la vegetació, sota pedres i troncs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 4,6mm i $\varnothing$ 1,9mm. 6-8 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: semicircular

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-0768, foto Gago & Cadevall,

HÀBITAT: Terrenys calcaris secs i assolellats. Viu sota pedres i entre la vegetació, tant a zones amb vegetació com sense ella i a turons o planes

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: > 5 mm. Alt.5,5mm i Ø 2,1mm. 7-9 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-0784, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie molt higròfila, que viu a parets calcàries ombrívols i terrenys margosos, a alzinars i pinedes entre la fullaraca i l'humus.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot Catalunya.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 8mm i Ø 2,75mm. 7-9 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: semicircular

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-0936, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Boscos frondosos i humits. Viu a les esquerdes de les roques, sota pedres i entre la fullaraca.

DISTRIBUCIÓ A CAT: S'estén per les províncies de Lleida, Girona i Barcelona.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 8mm, Ø 3mm. 11-12 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: marcada



MZB 2009-0983, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Parets rocoses calcàries. Viu a les esquerdes de les roques i entre fullaraca o sota de troncs. Es pot trobar també a rouredes, alzinars i zones de matolls.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Tot el territori català

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt.14,6mm, Ø 4,1mm. 9-11 voltes.

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-2405, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Roques i penya-segats calcaris. Viu generalment adherida a les roques, tot i que també pot trobar-se entre la fullaraca i la molsa.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Endemisme pirenaic. S'estén pel nord de Barcelona i Girona (comarques del Berguedà, Ripollès i la Garrotxa).

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 11,3 mm, Ø 2,9 mm.
8 ¹/₄-9 ⁵/₈ voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-1003, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Viu sobre roques calcàries, medis oberts, lleixes i forats amb molses. És freqüent trobar-la a grans parets calcària.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt.8mm, Ø 2,7mm.

OBERTURA AMB DENTS: sí

7-8 voltes

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-1175, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Viu adherida a les parets dels roquissars calcaris, a localitats entre 700 i 2.000m.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 11,5mm, Ø. 3,55mm. 6 ¾-10 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda

Truncatellina callicratis



MZB 2009-1126, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila de muntanya que viu entre la fullaraca i sota troncs a zones calcàries, tot i que també pot trobar-se a zones seques calcàries, a esquerdes o sota pedres.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 2,2mm, $\varnothing$ 0,96mm. 5 ½-6 ½ voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: profunda



MZB 2009-1187, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie xeròfila que viu a parets assolellades calcàries o associada a vegetació de pinedes, alzinar i matoll mediterrani. També es pot trobar sota pedres o a esquerdes de les roques, i prop de plantes arbustives i herbàcies.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 6-10mm, Ø 3mm. 7-11 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: levogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: marcada



MZB 2009-1204, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila, de zones boscoses i llocs ombrívols, constuïen el seu hàbitat típic els ecosistemes de ribera, alberedes i prats a prop de rius, tot i que també pot aparèixer a zones més seques. Viu entre la fullaraca i sota pedres, així com adherida a tronds d'arbres i tiges de plantes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 11 mm i Ø 6,0 mm.
6 ½-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial



MZB 2009-1209, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie xeròfila i calcícola, que viu a terrenys oberts i assolellats, cultius de secà i zones amb matolls, tot i que també es pot trobar a prats a prop dels rius, des del nivell del mar fins a zones de muntanya (tot i que més rarament). Forma colònies amb molts individus. Viu sota roques o sobre plantes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 25mm, Ø 12mm.
6-8 voltes

OBERTURA AMB DENTS: no

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: piriforme

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: superficial

Papillifera bidens bidens



MZB 2012-1222, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Tant a boscos com a medis rurals. Viu sobre murs, sota pedres i també a zones de cultius.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A la Península Ibèrica s'estèn pel litoral de Tarragona

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 17 mm i Ø 4,5 mm.
11-12 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: levogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: marcada

Clausilia bidentata abietina



MZB 2009-1278, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Viu a llocs de gran humitat ambiental, adherida a roquerars calcaris, sota pedres, trons i humus i a la base de les tiges de la vegetació.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A gran part de Catalunya a excepció d'algunes zones de la província de Lleida.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 13 mm, Ø 2,7 mm.
11-12 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries
fortes

GIR: levogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: marcada



MZB 2009-1313, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Viu a llocs de gran humitat ambiental, adherida a roquerars calcaris, sota pedres, trons i humus i a la base de les tiges de la vegetació.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Províncies catalanes de Girona i Barcelona, essent Girona la localitat tipus.

FORMA CONQUILLA: allargada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 12,5 mm, Ø 2,5 mm.
9-11 voltes

OBERTURA AMB DENTS: sí

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries
fortes

GIR: levogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: oblonga

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA:

SUTURA: marcada



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Vitrina_pellucida_01.jpg

HÀBITAT: Ambients humits de praderies al costat dels rius, rierols i pollancredes, i muntanyes en formacions coníferes i de matollar amb certa humitat. Viu entre molsa, herba i fullaraca, sota pedres i troncs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Distribuïda per bona part de Catalunya a excepció de la província de Girona.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 3,9 mm, $\varnothing$ 6,3 mm.
2-3 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Vitrea_contracta_19.jpg

HÀBITAT: Espècie calcícola i molt subterrània, característica de les pinedes amb escassa exposició solar, riberes de rius i rierols, tant a zones naturals com humanitzades, tolerant ambients secs. Viu entre la fullaraca, sota pedres i troncs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A bona part de Catalunya a excepció de la província de Girona.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤5 mm. Alt. 1,5 mm, Ø 3,0 mm.
3 ¾-5 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 2009-1643, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila lligada a ambients de fonts, rieres i riberes de rius, llocs pantanosos i vores de cultius. Viu entre la vegetació i la fullaraca o sota pedres i troncs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt 4,0 mm i $\varnothing$ 8mm
4-5 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 80-7387, photo Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Boscos de ribera, fonts, cultius de regadiu i jardins. Viu generalment sota pedres, troncs i entre la fullaraca.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt. 5,5 mm i Ø 18 mm.
5-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



MZB2009-1542, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Higròfila, habita generalment al costa dels cursos d'aigua, a ecosistemes de ribera, vores de cultius de regadiu, parcs i altres ambients ruderals amb humitat. Viu entre herba i fullaraca morta, i sota pedres. Carnívora, s'alimenta fonamentalment de cucs de terra.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt. 7,8 mm, Ø 16 mm.
5-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 2009-1455, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Típic de prats, és una espècie de muntanya i zones humides, de bosc de faig i rouredes, praderies i marges de medis aquàtics. Viu entre la fullaraca, molses i líquens, sota pedres i troncs i a l'humus. Tolera sòls àcids.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: ≤ 5 mm. Alt. 3,5 mm i $\varnothing$ 3,2 mm.
5-6 ½ voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat / cobert

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hygromia_limbata_01.jpg

HÀBITAT: Ambients humits i boscosos, tant fagedes, alzinars com rouredes. Viu a les vores dels camins, sota de pedres, troncs i fullaraca i en lleixes i roques amb vegetació muscínia.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A la meitat nord de Catalunya, absent a la província de Tarragona i a la meitat sud de les províncies de Lleida i Barcelona.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 14 mm i Ø 17 mm.
5-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat / cobert

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



MZB 2009-1668, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie de muntanya que viu a zones humides i ombrejades, boscos clars, fonts i prats, entre la fullaraca i l'humus.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A les províncies de Barcelona i Girona i la meitat nord de Lleida.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 12 mm i Ø 18 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



MZB 2009-1672, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie calcícola i higròfila, tot i que present a qualsevol tipus d'ambient, des de dunar costaner, prats xeròfils, estepes i pinedes, fins a zones humides de muntanya. Viu sota terra, sobre les plantes o sota pedres a llocs oberts.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: transparent

MIDA: >5 mm. Alt. 10 mm i Ø 17 mm
4 ½-6 ½ voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat / cobert

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



MZB 2009-1639, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Xerotèrmica, freqüent en ambients costaners i dunars, penetrant a l'interior per les valls dels rius. Viu adherida a les tiges de les plantes, troncs d'arbres i murs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català

FORMA CONQUILLA: piramidal/cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 17,8 mm i Ø 6,9 mm.
7 ½-9 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 2009-1652, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Ambients costaners i dunícoles amb cert grau d'humitat, així com a les ribes de cursos fluvials, cultius de regadiu, prats i pollancredes. Viu sota la fullaraca i pedres, i a les tiges de les plantes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot Catalunya a excepció de les zones dels Pirineu situades a gran altitud.

FORMA CONQUILLA: piramidal/cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 11,1 mm i Ø 8,1 mm.
5 ½-7 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cochlicella_conoidea_\(MNHN-IM-2010-13094\).jpeg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cochlicella_conoidea_(MNHN-IM-2010-13094).jpeg)

HÀBITAT: Espècie termòfila, calcícola i xeròfila, de zones dunars. Viu adherida a les tiges de les plantes o a la seva base, semienterrada a la sorra, depenent de les condicions ambientals.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Per tot el litoral català.

FORMA CONQUILLA: piramidal/cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 9,0 mm, Ø 7,1 mm.
5-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helicella_itala_02.JPG

HÀBITAT: Ruderal, camps de cultiu, zones humides de ribera i prats, mai forestal. Viu entre l'herba i talussos.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Només a zones altes, al nord de Catalunya.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 12 mm i Ø 23 mm.
6-7 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



<https://www.malacowiki.org/xerotrachaconspurcata/>

HÀBITAT: Zones humanitzades, marges de camins i conreus, tant a ambients humits com secs i exposats al sol. Viu sota pedres, al terra, entre la vegetació i la fullaraca, en esquerdes de roques, sobre escorces i fulles mortes. Habitual a murs i construccions.

DISTRIBUCIÓ A CAT:

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 5,0 mm i Ø 8 mm.
4-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: amb pèls

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: marcada



<http://www.animalbase.unigoettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/picture?id=5347>

HÀBITAT: Espècie termòfila i una mica xeròfila, de zones de matoll mediterrani, però també a pinedes i camins. Viu entre la vegetació, però sobretot sota pedres.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Comú a tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 11 mm i Ø 15 mm (no acostuma a arribar a 10mm). 4 $\frac{1}{4}$ -5 $\frac{3}{4}$

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



https://en.wikipedia.org/wiki/Trochoidea_elegans#/media/File:Trochoidea_elegans_01.JPG

HÀBITAT: Xeròfila de zones costaneres, viu sobre la vegetació. Utilitza les zones de regadiu com a vector de dispersió, especialment a l'interior de la vall de l'Ebre.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A Catalunya, a les costes i a l'interior a la vall de l'Ebre.

FORMA CONQUILLA: piramidal / cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 10,0 mm i Ø 12,0 mm. 6-7 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa / aquillada

SUTURA: superficial



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trochoidea_trochoides_01.JPG

HÀBITAT: Es tracta d'una espècie termòfila, calcícola i xeròfila, que habita les dunes costaneres. Viu sobre les tiges de la vegetació o a la base de la mateixa, semienterrada a la sorra.

DISTRIBUCIÓ A CAT: S'estén pel litoral català.

FORMA CONQUILLA: piramidal / cònica

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 7 mm i Ø 9 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC:

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: profunda



<http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/picture?id=5339>

HÀBITAT: Matoll mediterrani, zones ruderals, prats xeròfils i llocs esteparis. Viu sota pedres, a la base de la vegetació a vegades enterrada en contacte amb les arrels de les plantes i entre la molsa.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida / aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 5 mm i Ø 7,5 mm.
4-5 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: costelles / estries
fortes

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: profunda

Cernuella virgata



MZB 2009-1870, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie termòfila, quehabita tot tipus d'ambients calcaris i ruderals, a propdelmar o a estepes interiors.Viu tant sota de pedres com, sobretot, adherida a les tiges de les plantes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 19 mm i Ø 25 mm.
5-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



<https://www.malacowiki.org/files/microxeromagnalowei.jpg>

HÀBITAT: Tant a zones àrides com humides, naturals i antropitzades. Viu sota pedres, troncs i fullaraca, a vores de cultius i pastures.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A bona part del territori català, a excepció de la meitat nord de la província de Lleida.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 5 mm i Ø 7,5 mm.
4 ¼-5 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: amb pèls

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda

Xerosecta cespitum arigonis



MZB 2009-1903, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Calcícola i xeròfila. Viu a la vegetació dels camins, horts, vores de cultius, riberes, zones de matoll baix i prats en ambients ruderals, preferint llocs relativament humits. Constitueix plaques en plantacions de vímets, hortes, cultius de secà i guarets. Rara per sobre dels 1.000m d'altitud.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 17 mm i Ø 26 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa / estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helicodonta_obvoluta_01.JPG

HÀBITAT: Llocs humits, entrades de coves i parts calcàries. Viu sota pedres i fullaraca.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Al nord del territori Català, absent de la meitat sud de Lleida i de la província de Tarragona.

FORMA CONQUILLA: deprimida/aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 7 mm i Ø 15 mm.
6-7 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: amb pèls

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: semilunar

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda



MZB 2009-1605, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Calcícola i xeròfila, viu adherida a les roques i a les plantes, i entre la vegetació. Comú a àrees costaneres, resisteix la insolació directa durant l'estiu.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 21,1 mm i Ø 26,4 mm.
4 ½-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracollina_lenticula_01.JPG

HÀBITAT: Llocs humits i calorosos i zones d'influència antròpica. Viu sota pedres, troncs i esquerdes, a murs i entre la fullaraca.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A bona part del territori català, a excepció del nord de Lleida.

FORMA CONQUILLA: deprimida/aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 4,1 mm i Ø 9,0 mm
4-5 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: molt obert

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: profunda



MZB 2009-1926, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie de muntanya, rupícola, calcícola i higròfila. Viu entre la fullarca, a fisures i parets calcàries ombrívols, sota troncs o a les escorces dels arbres.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: deprimida/aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 9 mm i Ø 22 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils


GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: profunda



[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corneola_desmoulinsii_desmoulinsii_\(MNHN-IM-2010-13154\).jpeg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corneola_desmoulinsii_desmoulinsii_(MNHN-IM-2010-13154).jpeg)

HÀBITAT: Espècie de muntanya, rupícola, calcícola i higròfila. Viu a esquerdes de roques i parets calcàries ombrejades, i sota pedres i fulles a altitud entre 600 i 2.800m.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Pirineu i pre-Pirineu de Lleida fins a la Cerdanya a Girona.

FORMA CONQUILLA: deprimida/aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 6 mm i Ø 16 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: superficial



<http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/picture?id=4161>

HÀBITAT: Zones de matolls, bocss frondosos i roquerars amb baixa o mitja exposició solar, sempre a zones força humides. Viu a les esquerdes de les roques i murs, i sota pedres.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Nord-oest de Catalunya.

FORMA CONQUILLA: deprimida/aplanada

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 8 mm i Ø 15 mm.
5-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: obert / petit

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: angulosa /
aquillada

SUTURA: profunda

Theba pisana pisana



MZB2009-1979, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie termòfila, xeròfila i calcícola que viu a llocs àrids i costaners, adherida a les tiges de les plantes, on pot formar grups nombrosos. A zones d'interior es troba a les vores de cultius, pollancredes, horts, jardins o solars.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Pràcticament a tot el territori català a altituds inferiors a 900 m.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 20 mm i Ø 25mm.
4 ½-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: tancat / cobert

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial

Cornu aspersum



MZB 2009-2115, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila, viu a qualsevol tipus d'ambient, sobretot a jardins i vores de conreus. Viu sota pedres, fustes, plàstics o cartrons.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 40 mm i Ø 45 mm.
½-4 ½ voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: profunda

Eobania vermiculata



MZB 2009-2090, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Zones calcàries de baixa altitud, boscos de tipus mediterrani, ambients ruderals i costaners. Viu a horts, murs, roques, plantes i sota pedres. Freqüentment associat a la presència humana.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A bona part del territori català, a excepció del nord de Lleida.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 27 mm i Ø 33 mm.
5-6 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



MZB 2009-2097, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie calcícola que habita a ambients muntanyosos amb pinedes, alzinars i a zones esteparies amb matoll mediterrani. Viu a la base de les plantes, sota pedres i entre les esquerdes de les roques, a altituds des del nivell del mar fins els 1.800m.

DISTRIBUCIÓ A CAT: Al sud de Catalunya, especialment a la província de Tarragona.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 28,8 mm i Ø 41 mm.
3 $\frac{3}{4}$ -4 $\frac{3}{4}$ voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: arrodonida

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial



MZB 79-4227, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Bosc mediterrani, matolls baix i zona costanera. Viu sota pedres i a murs de pedra seca, jardins, vinyes i gran varietat d'ambients més o menys secs.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt 24 mm i Ø 40 mm.
4 ½-6 voltes

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 2009-2013, foto Gago& Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie higròfila que viu a boscos, matolls, prats, dunes i llocs humanitzats, tant sota pedres i troncs com adherida a les tiges de les plantes.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt. 22 mm i Ø 26 mm.
4 ½-5 ½ voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: marcada



MZB 2009-2058, foto Gago & Cadevall, 2014

HÀBITAT: Espècie termòfila i una mica xeròfita, pròpia del litoral mediterrani, regions estepàries i sub-muntanyoses de matolls. Viu tant sota pedres, esquerdes i murs com adherida a la vegetació.

DISTRIBUCIÓ A CAT: A tot el territori català.

FORMA CONQUILLA: globulosa

TRANSPARÈNCIA: opaca

MIDA: >5 mm. Alt 17 mm i Ø 25,4 mm
4-5 voltes.

OBERTURA AMB DENTS:

TEXTURA SUPERFÍCIE: llisa/estries dèbils

GIR: dextrogira

UMBILIC: sense umbilic

FORMA OBERTURA: ovalada

PERIFÈRIA ÚLTIMA VOLTA: arrodonida

SUTURA: superficial